

## **- - - O QUE É UMA CPRE? - - -**

A CPRE (colangipancreatografia retrógrada endoscópica) é um dos exames usados para diagnóstico e terapêutica das doenças do fígado, vias biliares, vesícula e pâncreas. É usado um endoscópio (tubo fino e flexível) que se introduz pela boca e, que após inspeccionar o estômago e duodeno, permite injectar contraste pelo orifício da papila (junção da via biliar com o duodeno), obtendo-se assim uma imagem por Rx das vias biliares, vesícula e pâncreas.

### **CPRE TERAPÊUTICA**

Esfincterotomia – No caso do exame mostrar que existem cálculos (pedras) ou obstáculos nas vias biliares. O médico poderá efectuar o corte da papila, por corrente eléctrica, que não é sentida pelo doente. Após a abertura do orifício da papila é possível retirar os cálculos da via biliar com ajuda de um cesto ou de um balão.

Colocação de Próteses – Uma prótese é um pequeno tubo de plástico ou de metal expansível que é introduzido nas vias biliares quando existe um obstáculo benigno ou maligno e, serve para aliviar a icterícia (cor amarela dos olhos e da pele). Por vezes estes tubos podem ter que ser colocados no pâncreas quando existem obstáculos nesse órgão.

### **E DEPOIS DO EXAME REALIZADO?**

Poderá sentir algum incómodo na garganta, pelo que não deverá comer ou beber durante pelo menos 2 horas. Caso não esteja em regime de internamento hospitalar, ficará em observação durante algumas horas. Não deve conduzir (pelo que deverá ter vindo acompanhado) e deverá ficar em repouso o resto do dia em casa.

### **O EXAME TEM RISCOS E COMPLICAÇÕES?**

A CPRE diagnóstica e terapêutica é considerada o exame apropriado para estudar / tratar a sua doença. É tão eficaz e mais seguro que a cirurgia, contudo, nem sempre é possível ter êxito e podem surgir complicações: a injeção do contraste poderá desencadear reacções alérgicas e, poderá também haver inflamação do pâncreas (pancreatite) ou das vias biliares (colangite).

Outras complicações possíveis são perfuração do tubo digestivo ou a hemorragia.

Estas complicações são raras, mas podem ser graves e exigir tratamento urgente: médico ou cirúrgico em 2% dos casos. O risco de morte é inferior a 1%.

Nas 24 horas após o exame e no caso de sentir dores, febre ou qualquer perturbação que considere importante, deve contactar imediatamente o seu médico ou dirigir-se ao Serviço de Urgência do hospital.

Problemas tardios – No caso de ter sido colocada uma prótese, esta poderá ficar obstruída, podendo aparecer febre, icterícia e dor, o que obrigará à colocação de nova prótese. Após período de tempo variável também podem reaparecer os cálculos na via biliar, o que poderá justificar um novo exame.